

GATIMOX®

Alginate de sodium 500 mg/ Bicarbonate de sodium 267mg

Suspension buvable en sticks

PRESENTATION

Boite de 12 sticks de 10 ml.

Boite de 24 sticks de 10 ml.

COMPOSITION

Chaque stick contient :

Principe actif:

Alginate de sodium500 mg

Bicarbonate de sodium 267 mg

Excipients :

Carbonate de calcium, gomme xanthane, saccharine sodique, arôme fenouil, parahydroxybenzoate de méthyle(E218), parahydroxybenzoate de propyle(E216), Hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Excipients à effet notoire : Parahydroxybenzoate de méthyle (40 mg par stick), parahydroxybenzoate de propyle (6 mg par stick), sodium.

La teneur en sodium est de 145 mg (soit en 6.3 mEq) par stick.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Autres médicaments pour l'ulcère peptique et le reflux gastro-œsophagien (R.G.O)

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Gatimox® est utilisé dans le traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien qui se traduit par des brûlures d'estomac, des remontées ou renvois acides et des aigreurs d'estomac.

CONTRE- INDICATIONS

Ne jamais utiliser Gatimox® en cas d'une hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ce médicament contient du sodium (teneur de sodium = 145mg par stick). A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de propyle et du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques.

EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Gatimox® interagit avec certains médicaments absorbés par la voie orale.

Associations faisant l'objet de précautions

d'emploi

La co-administration du Gatimox® avec d'autres médicaments peut entraîner une diminution de l'absorption digestive.

Par mesure de précaution, il est préférable de prendre Gatimox® à distance des autres médicaments.

Espacer la prise de GATIMOX® de plus de **2 heures**, si possible, avec :

- Antibactériens-antituberculeux (éthambutol, isoniazide) (voie orale)
- Antibactériens-cyclines (voie orale)
- Antibactériens-lincosamides (voie orale)
- Antihistaminiques H2 (voie orale)
- Aténolol, métoprolol, propranolol (voie orale)
- Chloroquine (voie orale)
- Diflunisal (voie orale)
- Digoxine (voie orale)
- Diphosphonates (voie orale)
- Fluorure de sodium
- Glucocorticoïdes (voie orale) (décrié pour la prednisolone et dexaméthasone)
- Indométacine (voie orale)

- Kayexalate (voie orale)
- Kétoconazole (voie orale)
- Lansoprazole
- Neuroleptiques phénothiaziniques (voie orale)
- Pénicillamine (voie orale)
- Sels de fer (voie orale)
- Sparfloxacin (voie orale)

Espacer la prise de ce médicament de plus de **4 heures**, si possible, avec :

- Antibactériens-fluoroquinolones (voie orale)

Associations à prendre en compte

Salicylés (voie orale) exemple de l'aspirine.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Gatimox® peut être prescrit pendant la grossesse et l'allaitement, si besoin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

POSOLOGIE

Un stick 3 fois par jour après les trois principaux repas et éventuellement le soir au coucher. En cas de reflux ou d'inflammation œsophagienne sévères, la posologie peut être doublée.

En cas de dose omise, ne pas compenser en doublant la dose.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Bien malaxer le stick avant ouverture.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, Gatimox® suspension buvable en sticks est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Constipation éventuelle qui est due à la présence d'alginate
- L'usage prolongé de ce médicament peut augmenter le taux de calcium dans le sang avec un risque de néphrolithiase et d'insuffisance rénale.
- Réactions allergiques (urticaire, bronchospasme, choc anaphylactique ou anaphylactoïde)

SI VOUS RESSENTEZ DES EFFETS INDESIRABLES NON MENTIONNES DANS CETTE NOTICE, OU SI CERTAINS EFFETS INDESIRABLES DEVIENNENT GRAVE, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Sans objet.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de GATIMOX®, que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Une utilisation excessive pourra entraîner une aggravation des effets indésirables.

D'une façon générale, il est recommandé de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute et de signaler tout traitement en cours ou tout effet non souhaité ou gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de révision de la notice : Avril 2018

NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA D.E./ FABRICANT/CONDITIONNEUR

NADPHARMADIC-Production.
Zone industrielle El-Rhumel N24°, Constantine Algérie.

N° DE : 19/ 10 G 054 /468

N/BAT/NOT/PF000037



